وزارة الصحة
Ministry of Health

مستشفى الولادة والأطفال - بريدة

إعرف دوائـــك



أسم الدواء العلمي: أبيكسابان

Drug Generic Name: Apixaban

فهرس المُحتويات:

لماذا يوصف هذا الدواء؟

يستخدم لعلاج الجلطات الدموية أو منعها

الاحتياطات الواجب إتباعها قبل استخدام هذا الدواء؟

- إذا كنت مصابًا بحساسية تجاه هذا الدواء أو أي مكون منه أو أي دواء آخر أو أطعمة أو مواد أخرى.
- أخبر طبيبك بخصوص الحساسية والعلامات التي ظهرت عليك.
- إذا كان لديك أيّ من هذه المشاكل الصحية:
  - نزيف نشط أو مشاكل في الكبد.
  - إذا كنت تعاني من متلازمة أضداد الفوسفوليبيدات (APS).
  - إذا كان لديك أو تخطط لاستبدال أحد صمّامات القلب.
- أخبر طبيبك والصيدلي الذي تتعامل معه عن كل الأدوية التي تتناولها (التي صُرفت بوصفة طبية أو الأدوية المتاحة دون وصفة طبية أو المنتجات الطبيعية أو الفيتامينات) ومشاكلك الصحية.
- إذا كنت مرضِعة فلا ترضعي من الثدي أثناء تناول هذا الدواء.

التعليمات الواجب إتباعها أثناء استخدام هذا الدواء:

- أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية لك ومنهم الأطباء والممرضين والصيادلة وأطباء الأسنان بأنك تتناول هذا الدواء.
- قد يلزم إيقاف هذا الدواء قبل أنواع معينة من الجراحة كما أخبرك طبيبك. إذا تم إيقاف هذا الدواء ، سيخبرك طبيبك متى تبدأ في تناول هذا الدواء مرة أخرى بعد الجراحة أو الإجراء.
- قم بفحص الدم كما أخبرك الطبيب.
- لا تتوقف عن تناول هذا الدواء دون استشارة طبيّة.
- قد تنزف بسهولة أكبر فكن حذرًا وتجنّب الإصابة ولكن من النادر ما تكون بعض مشكلات النزيف خطِرة.
- استخدم فرشاة أسنان ناعمة وماكينة حلاقة كهربائية.
- إذا وقعت أو جرحت نفسك أو إذا أصبت برأسك فاتصل بطبيبك على الفور. عليك بالتحدث مع طبيبك حتى لو كنت تشعر أنّك بخير.
- أخبري طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل فسوف تحتاجين إلى التحدث عن فوائد ومخاطر استخدام هذا الدواء أثناء الحمل.

الأسباب الدَّاعية للاتصال بأخصائِي الرعاية الصحيَّة على الفور:

<u>تحذير/ تنبيه:</u> حتى وإن كان ممكن أن تكون نادرة، بعض الناس ممكن أن تظهر لديهم أعراض جانبية سيئة جداً وبعض الأحيان تكون مُميتة. تحدث مباشرة مع طبيبك أو أبحث عن مساعدة طبية بسرعة إذا كان لديك أياً من الأعراض التالية:

- أعراض لرد فعل تحسسي: كالطفح الجلدي أو ما يعرف بالشرى، أو الكحة، أو احمرار أو تورم أو انتشار البثور أو تقشر للشفتين ويصاحب ذلك حُمى أو بدون حُمى، صفير مُصاحب للتنفس أو ضيق في الصدر، مشاكل في التنفس، تورم في الفم أو الوجه أو الشفاه أو اللسان أو الحلق.
- علامات نزيف مثل التقيؤ أو سعال الدم. دم في البول. براز أسود أو أحمر ؛ نزيف اللثة. نزيف مهبلي غير طبيعي. كدمات بدون سبب ؛ او نزيف لا يمكنه التوقف.
- ضعف في جانب واحد من الجسم ، أو صعوبة في التحدث أو التفكير ، أو تغير في التوازن ، أو تدلي جانب واحد من الوجه ، أو تشوش البصر.
- الدوخة أو الإغماء.
- الشعور بالتعب أو الضعف.
- الشعور بالارتباك.
- صداع الراس.
- ألم أو تورم المفاصل.
- ألم أو ضغط في الصدر.

الأعراض الجانبية للدواء وما يجب عمله عند حدوثها:

جميع الأدوية ممكن أن تتسبب في ظهور أعراض جانبية، على أي حال العديد من الناس لا تظهر لديهم هذه الأعراض أو تكون لديهم أعراض طفيفة.

كيفية استخدام هذا الدواء:

تناول هذا الدواء حسبما أمر طبيبك واقرأ جميع المعلومات المقدمة لك واتبع كافة الإرشادات بعناية.

- خذ مع أو بدون الطعام
- إذا كنت تواجه صعوبة في ابتلاع هذا الدواء ، فيمكن سحقه وخلطه في الماء أو عصير التفاح أو عصير التفاح. إذا قمت بسحق هذا الدواء وخلطه ، فتناوله في غضون 4 ساعات من الخلط.
- استمر في تناول هذا الدواء كما أخبرك طبيبك أو غيره من مقدمي الرعاية الصحية ، حتى لو كنت تشعر بتحسن.
- أولئك الذين لديهم أنابيب تغذية قد يستخدمون هذا الدواء. استخدم كما قيل لك. اغسل أنبوب التغذية بعد إعطاء هذا الدواء.

ماذا أفعل في حال نسيان جرعة؟

خذ جرعتك فور تذكرها إلا إذا كان وقت تذكرها قريباً من موعد الجرعة التالية فيجب عليك أخذ الجرعة التالية فقط وتجاهل الجرعة السابقة، لا تتناول جرعتين معاً لتعويض الجرعة الفائتة.

كيفية تخزين الدواء؟

- يُحفظ هذا الدواء في درجة حرارة الغرفة العادية بين (15– 25) درجة مئوية.
- أحفظ الدواء في مكان آمن وبعيداً عن متناول الأطفال.
- يجب التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية وغير المستخدمة.